

ANTONIO BERLESE  
(VIA ROMANA, 19 — Firenze)

---

## LISTA DI NUOVE SPECIE E NUOVI GENERI DI ACARI

---

Nei manipoli V e VI, di recentissima pubblicazione, illustro 100 specie di acari, di cui do anche le figure. Moltissime altre specie nuove ho tuttavia già studiate e di presente, appunto, do le diagnosi di oltre un centinaio di esse, di tutto il mondo, mentre continuo lo studio del ricchissimo materiale, che gran numero di naturalisti mi invia benignamente di ogni dove e di quello ancora che vado io stesso raccogliendo in Italia.

Le specie qui elencate saranno illustrate con più estese diagnosi e con figure nei *Manipoli* VII, VIII e IX, ai quali attendo.

### PROSTIGMATA.

**Tetranychus pantopus** n. sp. (Foem). Triangularis, valde humeratus, setis curtioribus, crassis, scabratulis ornatus; pedibus omnibus (praecipue primi et secundi paris) corpore saltem duplo longioribus. Ad 250  $\mu$ . long.; 220  $\mu$ . lat. (cum pedibus, a summo pede antico usque ad summum posticum 1000  $\mu$ . long.).

*Habitat* super *Ficus* sp., « Moreton Bay, Anstralia ». (Froggatt!).

**Tetranychopsis histricina** n. sp. Color? Facies *T. horridae* sed non vel vix excavata in dorso, pilisque dorsi multo exilioribus, apice lenissime barbatulis, tuberculo subnullo sustentis. Ad 550  $\mu$ . long.; 360  $\mu$ . lat.

*Habitat* super arbores fructiferas in « Australia » N. S. W. (Froggatt!).

**Ereynetes cruciatus** n. sp. *E. veloci* Europae subsimilis sed sculptura scuti diversa. In scuto (dorsuali cephalothoracis) lineae chitinae sunt antrosum directae valde divergentes, haud ramosae; posticae e medio scuto descendentes utrinque duae, externae extrorsus ramosae; transversa postica nulla. Ad 300  $\mu$ . long.; 160  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Duo collegi exempla super *Copris molossus*, « Giava ». (Jacobson!), quare in fimo obvium puto.

**Ereynetes inermis** n. sp. Albido-hyalinus. Scutum Antici dorsuale nullum. Pili corporis brevissimi et crassiusculi, exceptis consuetis duobus Antici et postici corporis tactilibus perlongis, exilioribus. Palpi 4-articulati. Ad 200  $\mu$ . long.; 110  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria ad terram, « Firenze ».

**Rhagidia heteropoda** n. sp. Albicans, setis humeralibus robustis, longis, caeteris curtis; palporum articulo postremo vix duplo longiore quam lato, ovale; pedibus anticis caeteris multo longioribus et (fere duplo) crassioribus. Ad 500  $\mu$ . long.; 200  $\mu$ . lat.

*Habitat* in muscis Etruriae « Toiano, Pisa ».

Gen. **Alicorhagia** n. gen. Facies gen. *Rhagidia* sed characteres gen. *Alicus*, sive abdomen sulcis transversis signatus, palpi 5-articulati; anticum setis sensorialibus etc. Unguis pedum unicus. Mandibulae robustae, chela valida, fere ut in *Rhagidiis*. Species typica *A. fragilis* n. sp.

**Alicorhagia fragilis** n. sp. Albido-hyalina, elongata, setis curtis, barbatulis bene induta, tactilibus Antici longissimis, exilioribus.

Pseudocapitulum late conicum. Pars antica abdominis lateraliter constricta fere ut in subgen. *Leptalicus* (ex gen. *Alicus*). Pedes longi et robusti. Ad 250  $\mu$ . long.; 100  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putrescentia ad terram, « Firenze ».

## MESOSTIGMATA.

**Discopoma integra** n. sp. Foem. ovalis, convexa, sento dorsuale ovato, laud impresso vel aliter sculpto, aequo convexo, leniter punctulato. Scutum dorsi marginale integrum, totum aequo chitineum, transverse striatulum. Scutum genitale longe ovatum, usque ad extremas quartas coxas productum. Ad 450  $\mu$ . long.; 360  $\mu$ . lat.

*Habitat* sat rara in muscis ad « Vallombrosa, Palermo, Roma ».

**Discopoma simplex** n. sp. Foem. terreo-badia, ovalis, nostrae *D. splendidae* et *D. simulantis* subsimilis sed sento dorsuali medio non vittis chitineis transversis cum marginali coniuncto, tantum mucronibus utrinque tribus galli cristae subsimilibus, vix elevatis. Ad 850  $\mu$ . long.; 650  $\mu$ . lat.

*Habitat* in ligno putri « Batavia, Giava ». Collegit Clariss. Jacobson.

**Discopoma puella** n. sp. Foem. terrea, ovalis (tamen postice vix latior). Scutum dorsuale bigibboso-carinulatum, in parte media bene areolatum, ad latera nitidum, lineis exilioribus aliquot transversis signatum. Pars abdominis postica sentulis perparvulis sex, piliferis ornata. Scutum genitale maius, rectangulum, anteriorius vix rotundatum, posterius truncatum (ad extremas quartas coxas), totum sternum occupans. Ad 430  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat.

*Habitat* in foliis putribus « Columbia ».

**Trachyuropoda (Janetiella) dominula** n. sp. Testacea, lagenaeformis, tota aequo reticulata, excepto sento genitali foeminae. Dorsum in medio longitudinaliter vix depressum. Margines

verruculati setis omnino destitui. Foeminae scutum genitale ferri equini perlongi instar configuratum, anterius tamen attenuatus. Mas sterno expolito, scuto genitali inter quartas coxas. Ad 550  $\mu$ . long.; 350  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo, « Florida ».

**Trachytes pi** n. sp. Badius; facies *T. lambdae*, cuius affinis, quamvis scutulorum foeminae ventralium fabrica bene diversus. Foem. Crista chitinea ingularis, ante scutum genitale  $\pi$  graeci-formis. Scutum genitale bene trapezinum, lateribus rectis; latere antico vix incurvo, angulis fere in spinam transverse desinentibus. Scutula piligera ventralia (ante scutum anale) nulla. Ad 700  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria, « Palermo ».

**Dinychus appendiculatus** n. sp. Badius, longe cordatus, postice acutus; scuto medio dorsuale posterius in appendiculam brevem, bene chitineam, subspathuliformem, prominulam desinens. Foeminae epigynium amygdaliforme usque ad mediam posteriorum pedum coxam productum. Foem. et mas ad 660  $\mu$ . long.; 400  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Collegi profunde infossum in terra Florentiae.

**Zercon columbianus** n. sp. *Z. trigono* prima facie subsimilis sed margine postico integro dermateque dorsi minus sculpto, pilisque lateralibus diversus. Adsunt enim utrinque ad margines septem pili curti, penicillati, aequedissiti. Prope marginem posticum annuli (interrupti) quatuor sunt chitinei ut in *Z. triangulari*. Ad 330  $\mu$ . long.; 270  $\mu$ . lat.

*Habitat* in foliis putrescentibus, « Columbia ».

**Zercon radiatus** n. sp. Sat *Z. ornato* similis sed bene diversus. Margo abdominis posticus integer setisque destitutus. Margines laterales utrinque setulis plumoso-clavatis 16 bene erectis et longiusculis, radiatim ornati. Setae plumatae plures sunt in dorso. Sculptura dorsi sat tenuis. Ad 360  $\mu$ . long.; 270 lat.

*Habitat*. Foeminam collectam vidi in « Florida (Lake City) ».



**Zereon triangularis** K. var. **granosus** n. var. Differt a typico propter scutum posticum dorsi granulis rotundis elevatis, sat crassis ornato. Ad 600  $\mu$ . long. (foem.).

*Habitat.* Foeminas tres mecum communicavit Cl. Trouessart, collectas ad « Ardiche » in Gallia, inter muscos montium 2000 metr. altorum.

**Zereon triangularis** K. var. **caudatus** n. var. Differt a typico praecipue setis duabus posticis medianis perlongis, (dimidiam fere corporis latitudinem aequantibus) exilius desinentibus. Ad 450  $\mu$ . long. (foem.).

*Habitat* frequens in muscis montium altiorum; ad ex.: « Tiarno » in agro Tridentino; « Vallombrosa » prope Florentiam; « Cansiglio » in agro Veneto; « Bergamo » etc.

**Ceratozereon bicornis** C. et F., var. **elongatus** n. var. Differt a typico corpore magis elongatiori, nec non setis magnis e tuberculo postremo orientibus simplicibus, robustis, haud barbatus, apice acutis. Ad 340  $\mu$ . long.; 190  $\mu$ . lat. (foem.).

*Habitat* in muscis, in « Florida (Lake City) ».

Subgen. **Anoplocelaeno** n. subgen. (Subgenus gen. *Celaenopsis*). Abest scutum rectangulum ad ventrem post anale inter senta ventris marginalia impar. Species typica *C. A. ovata* Berl.

**Celaenopsis (Anoplocelaeno) nummulus** n. sp. Badia, subcircularis, pilis mediocribus, robustis, aequedissitis in margine ornata. Mas corniculis labialibus polliciformibus, extrorsus directis. Epistoma in mucronem acutum desinens. Ad 780  $\mu$ . long.; 600  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Alphitobius* sp., « Giava ». (Jacobson!).

**Celaenopsis (Anoplocelaeno) longiseta** n. sp. Foem. badia, perfecte ovalis, setis marginalibus minimis, duabus tamen posticis longiuseculis, duabusque in quoque margine postero-laterali corporis latitudinem superantibus. Epistoma in mucronem angulatum desinens. Ad 700  $\mu$ . long.; 540  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Ceropales fasciata*, « Africa ».

**Celaenopsis** (*Anoplocelaeno*) **andreinii** n. sp. Ochraceo-badia, bene ovalis, scuto postice setis quatuor magnis (externis maioribus). Maris corniculi labiales setuliformes, calcar mandibulae cultriformis e basi digiti processus. Ad 750  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Hololepta plana*, « Grosseto ». Dedit mihi benignissime Cl. Doct. Andreini rei entomologicae benemeritisimus eique dicatam volui.

**Euzercon** **hirtellus** n. sp. (Mas) badius, sat longe ovatus, postice truncatus. Sternum anterius valde ante primas coxas productum, bene bilobum. Corpus totum pilis longis, aequedissitis ad margines et posterius ornatum. Corniculi labiales hyalini, attenuati, antrorsus directi. Ad 850  $\mu$ . long.; 550  $\mu$ . lat. Mas esse videtur speciei *E. ovulum* Berl. (« Giava »), sed multo elongatior est quam foemina speciei supradictae.

**Heterozercon** **audax** n. sp. Badius, postice longe bisetus, tibiis tarsisque anticis elongatissimis; Foem. palporum articulo primo inferne calcari spiniformi maximo armato. Ad 1700  $\mu$ . long.; 1450  $\mu$ . lat.

Mas curtior, vix minor, femure primi paris interne spinis longissimis perrobustis quatuor; palporum articulo primo inferne alte tuberculato; pedum secundi paris femure inferne calcari uno validiori, interne serrulato, duobusque aliis longe conicis perrobustis; genu breviter calcarato, tibia calcare robusto, conico. Mandibularum digiti elongatissimi; mobilis cylindricus, interne fimbria pectiniformi totus ornatus; fixus etiam longior, cylindricus, rectus, spiraliter convolutus. Ad 1200  $\mu$ . long.; 1000  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Scolopendram* quamdam et super *Spirostreptum* ad « Wijnkoosbaai; Giava ». Collegit Cl. Jacobson.

Subgen. **Greeniella** n. subgen. Ex genere *Iphiopsis*. Cum gen. *Greenia* in eadem familia (*Greenidae*). Peritrema nullum (scutumque peritrematicum nullum, tantum stigmaticum, trigonum). Foem. Mandibulae stylo longo ad summum digitum fixum. Scutum genitale minimum, vix lineolam minimam sistens sub

ynlva nuda insitum valde a sterno et a scuto anale remotum. Mares ignoti. Species typica *I. G. submollis* n. sp.

**Iphiopsis (Greeniella) submollis** n. sp. Foem. testacea, cordiformis, postice acuta. glaberrima; scuto dorsuale vix plus quam dimidiam anticam partem abdominis obtegente. Pedes et rostrum ut in gen. *Celaenopsis*. Ad 800  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat.

*Habitat* supra *Scolopendra* sp., « Giava ».

**Holostaspella hirsutissima** n. sp. Saturate flavobadia, ovata, sat humerata, pilis crassis, longis incurvis, ad marginem posticum densioribus, in corpore ornata. Scutum dorsuale longitudinaliter sat alte tricarinatum. Pedes sat longi, asperrimi. Scuta ventralia non bene sculpta. Ad 1150  $\mu$ . long.; 700  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris bituberculatus* cum *Holocaeleno rotunda* « Texas » et super *Copris carolina*, « America boreale ».

**Holostaspella caelata** n. sp. Terrea. Foem. scuto dorsuali minus sculpto quam in *H. sculpta*, epigynio haud sculpto; sterno anterius crista chitinea x-formi perconspicua; scuto anale aequae longo ac lato. Mas (vere huius speciei?) pentagonus, vix elongatus, postice truncatus, crinibus longis in corpore ornatus; scuto anale a sternale seiuncto; pedes secundi paris inermes; tertii tarso basi calcare bifido robusto; quarti paris trochantere inferne alte gibboso, bituberculato; femure inferne calcari pollicipato, magno, basi tuberculigero; tibia inferne tuberculigera; tarso contorto, basi, in medio et apice cornubus robustis armato. Foem. Ad 600  $\mu$ . long.; 400  $\mu$ . lat. Mas ad 550  $\mu$ . long.; 400  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter pilos sterni *Copris hamadryas* F. ad « Capo di Buona Speranza ». Plura possideo exempla.

**Holostaspella foai** n. sp. Foem. terrea, rectangula, scutis ventralibus minus bene sculptis, dorsuale in medio excavato, carinisque duabus longitudinalibus e circinibus pluribus incompletis constitutis ornato, setisque simplicibus vel vix barbatulis, longiusculis, incurvis, praecipue in margine postico indnto. Ad 650  $\mu$ . long.; 430  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris*, « Giava ». Coll. Cl. Jacobson !

Cl. dominulae Annae Foà rerum naturalium et praecipue entomologiae cultrici eximiae speciem pulchram dicatam volui.

Gen. **Holocelaeno** n. gen. Characteres generis *Holostaspis* faciesque generis *Celaenopsis*, praecipue pedum fabrica. Mandibulae penicillo laterali permagno, late scopiformi. Mares foeminis suis multo minores.

**Holocelaeno mitis** n. sp. Foem. Non laete badia, ovalis, haud humerata. Scutum genitale tripartitum videtur propter partem mediam trapezinam a lateralibus costuliformibus spatio subhyalino seunctam. Scutum anale parvulum, vix longius quam latum. Ad 650  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Super *Deltochilum gibbosum* Fabr., circa antennas, « Texas ».

**Holocelaeno rotunda** n. sp. Foem. badia, bene humerata, ovato-rotundata, scuto dorsuale angulatim ad ventrem extremum inflexo; sentis ventralibus omnino ut in *Holostaspis*; anale latiore quam longo (long. 200; lat. 250) magno. Ad 700  $\mu$ . long.; 550  $\mu$ . lat.

*Mas* parvulus, ovatus; scuto ventrale omnino ut in maribus gen. *Pachylaelaps*; calcari mandibularum simpliciter falcato, consuetae magnitudinis ut in *Holostaspis*. Ad 500  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Plura collegi exempla super *Copris bituberculatus*, « Texas » ad maxillas palposque sub capucio abscondita nec non super *Copris carolina*, « America boreale ».

**Holocelaeno crispa** n. sp. Foem. Testaceo-fuliginea, bursiformis, tota in dorso et ad margines setis longiusculis, incurvis, crispis dense ornata. Scutum anale trigonum, longius quam latum. Ad 680  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat.

*Habitat* super coleoptera varia, praecipue coprophila (*Copris* et gen. affinia), « Giava ». Coll. Jacobson !

**Holocelaeno magna** n. sp. Foem. saturate badia, late ovalis, postice rotundata, glabra. Sternum linea recta transversa signatum; scutum anale longius quam latum; anterius semicirculare, genitali sat appressum (long. 330; lat. 250). Ad 1000 p. long.; 700 p. lat.

*Habitat* super *Phanaeus perspicillatus*, « Equador ».

**Holocelaeno longicoma** n. sp. Mas terreus, sat cordato-ovatus, pilis longis et densioribus totus alte hirtus. Femur secundi paris inferne calcari conico auctum; calcar mandibularum falcatum, retrorsum reflexum. Ad 370 p. long.; 230 p. lat.

*Habitat* super *Copris carolina*, in « America boreale ».

**Holocelaeno bursiformis** n. sp. Foem. Laete badia, bursiformis subglabra; sento anale hemidiscoidale, multo latiori quam longo. Ad 550 p. long.; 370 p. lat.

Mas terreus, cordiformis, humeratus, postice acutus, glaber; femure secundi paris calcare conico ornato. Ad 350 p. long.; 200 p. lat.

*Habitat* super *Copris carolina*, « America boreale ».

**Holocelaeno trochantalis** n. sp. Foem. Badia (saturate), trochanteribus omnibus (exceptis primi paris) fasciis, subfuliginis. Corpus ovale, haud humeratum. Scutum anale magnum, subdiscoidale. Ad 900 p. long.; 610 p. lat.

*Habitat* super *Copris ephialtes*, « Brasile ».

**Holostaspis caligynius** n. sp. (Foem.). Flavo-badius, elongatus, lateribus parallelis, postice rotundatus, pilis sat brevibus auctus. Scutum anale circiter aequale longum ac latum: genitale ornatum, sive lineis arcuatis lateralibus nec non margine antico serrulato-crenatis. Ad 720 p. long.; 430 p. lat.

*Habitat*. Plures foeminas collegi super *Copris* plurimum specierum, « Giava ». (Jacobson!).

**Holostaspis punctulatus** n. sp. (Foem.) Terreo-flavidus, elongatus, humeratulus, postice acutus, eunte pilosus; sento anale

aeque longo ac lato; sterno punctulis aliquot minutis quasi perforato. Ad 550  $\mu$ . long.; 290  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris molossus* aliosque, « Giava ». Coll. C. Jacobson.

**Holostaspis dispar** n. sp. Mas a foemina sua (?) valde diversus praecipue statura et dermate minus chitineo, pellucido, incolore.

Mas rhombicus, curtus, postice acutus, pedibus secundi paris caeteris vix crassioribus, femure calcari pollicipato, robusto, genu tibiaque vix tuberculo minimo auctis; quarti paris femure inferne bimucronato-calcarato. Pellucidus, albicans. Ad 500  $\mu$ . long.; 330  $\mu$ . lat. Foem. terreo-badia, ovalis, asperata, pilis pereurtis induta; scuto genitale a sternale discreto; scuto anale aliquanto longiore quam lato (long. 230, lat. 210). Ad 800  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris* sp., « Giava ». Collegit Clarissimus Jacobson.

**Holostaspis hamadryadis** n. sp. Foem. Flavidus, sat longe ovatus, non humeratus, postice acutus. Pedes sat longi et robusti, quarti paris spinis curtis in tarso; secundi paris spinis ad apicem tarsi fere ut in *Pachylaelaps* robustis. Scuta ventralia haud sculpta. Pili simplices in dorso et ad margines, curtuli. Sentum anale bene longius quam latum, sive: 290 long.; 230 lat. Foem. ad 880  $\mu$ . long.; 520  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris hamadryas* (« Capo di Buona Speranza »); pluras foeminas collegi in ore, inter maxillas absconditas.

**Holostaspis longipes** n. sp. (Foem.). Terreo-flavidus, grandis, ovalis, setis in corpore crassis, plumosis, praecipue in dorso et in pedibus (pedum quarti paris praecipue ad tarsum longis, hirtis) ut in *H. tardo*. Pedes longiores et robusti. Epistoma ramusculis lateralibus bifidis longioribus, fere medium longitudine aequantibus. Scuta ventralia reticulato-sculpta; anale



aliquanto longius quam latum (long. 330; lat. 280), lateribus excavato-impressis. Ad 1150  $\mu$ . long.; 650  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris isidis*, « Egitto ».

**Holostaspis isidis** n. sp. Flavo-badius. Foem. bene humerata, cordiformis, post humeros attenuata, postice subacuta. Pedes minus longi (quamvis robusti) minusque spinosi quam in *H. longipede* cum quo est collectus. Pili dorsi et marginales simplices, exiles, curtiores. Spinae ad apicem secundi paris robustiores. Scutum anale fere aequae longum ac latum, sive: 290 long.; 250 lat. Senta omnia dorsi ventrisque laevia. Ad 830  $\mu$ . long.; 520  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris isidis*, « Egitto ».

**Holostaspis adulescens** n. sp. Foem. terrea, elongate cordiformis, sat humerata, subglabra; scuto anale vix longiore quam lato. Ad 450  $\mu$ . long.; 280  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris hypocrita*, « Pernambuco ».

**Gamasus (Gamasus) policentrus** n. sp. Terreo-badiusculus, facies *G. furcati*. Epistoma trispinum, spina media vix caeteris maiore. Mas chelae digito fixo gibboso, apice acuto-truncato; corniculi labiales articulo extremo simpliciter conico; palporum articulo secundo inferne corniculo uno, pilifero. Pedes secundi paris fere ut in *G. runcigero*, sed processu conico, erecto ad basim internam calcaris femoralis perconspicuo, aliisque duobus minoribus in axilla ad basim tuberculi axillaris. Ad 780  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat. *Foem.* bursiformis, epigynio lato, fere ut in *G. furcato*, sed endogynio processibus duobus chitineis, polliciformibus, magnis, a parte antica retrorsus pendulis, perconspicuis aucto. Ad 800  $\mu$ . long.; 550  $\mu$ . lat.

*Habitat* in museo agri panormitani.

**Gamasolaelaps arcuatus** n. sp. Nympha coleoptr. Pallide flava, cordata, humerata, setis eurtis ornata. Senta dorsualia marginibus integris: posticum posterius rotundatum, denique truncatum. Epistoma spina media longissima, apice inferne recurva,



lateralibus parvis, acutissimis; chelae exiliores. Ad 550  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat.

*Habitat* in ligno putri, « Batavia, Giava ». (Jacobson!).

**Gamasiphis elegantellus** n. sp. Foem. Badia, hemisphaerica (fere aequae longa ac lata), in dimidio antico dorso setis longis, robustis saltem utrinque sex ornata; posticae setis crassiusculis, longis duabus (utrinque una). Ad 550  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo (« Buitenzorg, Giava »). Collegit Clariss. Jacobson.

**Epicroseius seioides** n. sp. Flavidus, facies *E. angeloidis* sed corniculis posticis setisque curtioribus, pedibusque anticis minoribus. Ad 600  $\mu$ . long.; 390  $\mu$ . lat. (foem.).

*Habitat* super *Batocera hector* aliisque huius generis speciebus ad « Batavia (Giava) ». Collegit Cl. Jacobson.

**Ameroseius bispinosus** n. sp. (Foem.). Badius, sat bursiformis, elongatus, dorso scutoque anali (late semicirculari) reticulatis; setis curtis ad margines, duabus tamen posticis, una in quoque latere, magnis, robustis, spiniformibus. Scutum genitale rectangulum, postice truncatum. Adsunt scutula sex minima, ovalia, post scutum genitale (in lineis duabus) transverse disposita. Metapodia sat magna, trigono-ovalia. Ad 680  $\mu$ . long.; 480  $\mu$ . lat.

*Habitat* in foliis putribus, « Palermo ».

**Ameroseius jacobsoni** n. sp. Terreo-flavus; facies *A. muricati*, sed pedibus multo longioribus. Tarsi omnes (praecipue primi et secundi paris) elongatissimi. Pedes antici et postici corpore multo longiores. Setae corporis subspiniformes, sat curtulae. Scutum anale perfecte rhombicum, latius quam longum. Ad 580  $\mu$ . long.; 330  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Plura exempla vidi collecta a Cl. Jacobson (cui species dicata) super dipterum quoddam ex fam. Tipulidae, « Batavia, Giava ».

**Ameroseius geometricus** n. sp. (Foem.) Testaceus, ovatus, dorso lineis chitineis crassis in areolis sat magnis, polygonalibus (secundum lineam longitud. mediam minoribus) toto reticulato, fere ut in *A. hirsuto*. Pili corporis curti, spatuliformes, cristis longitudinalibus serrulatis. Ad 400  $\mu$ . long., 260  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Tyckia Walliki* (Giava) et super *Diastocera trifasciata*, « Africa ».

**Ameroseius flagellatus** n. sp. (Foem.). Testaceus, ovatus, lateribus parallelis, postice bene rotundatus. Derma dorsi areolatum. Pili dorsi duo verticis, duo humerales, duo scapulares, quatuor ad quartos pedes laterales duoque postici, corporis latitudinem multo superantes. Adsunt pili minores praecipue ad margines senti dorsualis. Pedes mediocres, omnes crassitie pares. Scutum anale mediocre, ovato-rhombicum. Ad 340  $\mu$ . long.; 220  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Batocera* sp., « India orient. ».

**Ameroseius favosus** n. sp. Foem. terrea, elongate ovalis, margine senti dorsualis postice undulato-scabrato. Scutum dorsuale, praecipue in medio, perconspicue reticulatum, quasi favosum, pilis curtis simplicibus auctum. Pedes curti, corpore multo breviores. Ad 420  $\mu$ . long.; 220  $\mu$ . lat.

*Habitat* in glandulis trunci *Acaciae* sp., « Tasmania ». Coll. Cl. Froggatt.

Gen. **Asternoseius** n. gen. Facies gen. *Ameroseius*, sed scuta ventralia foem. valde diversa. Sternum abest; sub ingularia derma nudum; sterni tantum fragmenta sunt parvula ante foramen genitale, quod a ventrale est seiunctum. Pedes antici ambulacro destituti. Species typica *A. ciliatus* n. sp.

**Asternoseius ciliatus** n. sp. Badius, pyriformis, perconvexus, nitidus. Tarsi antici subclavati, apice setis duabus longissimis nec non mucrone quodam hyalino. Epigynium perfecte trigonum, antierius peracutum. Scutum ventrale (cum anale) ma-

gnum, subsemicirculare. Epistoma trigonum. Mas ignotus. Ad 530  $\mu$ . long.; 350  $\mu$ . lat.

*Habitat* in muscis ad « Casale Monferrato ».

Gen. **Paradoxiphis** n. gen. Foem. scutis ventralibus fere ut in *Megalolaelaps*; pedibus secundi paris caeteris multo exilioribus; primi paris validioribus. (Mas ut in gen. *Megalolaelaps*?). Ambulacra magna, tantum membrana constituta, unguiculis nullis. Species typica *P. tenuibrachiatus* n. sp.

**Paradoxiphis tenuibrachiatus** n. sp. Foem. ochracea, bursiformis, haud humerata, postice acuta, ventre (post scuta sternalia) dense pilis sat longis obsito. Scutum anale perlonge rectangulum. Pedes secundi paris caeteris multo exiliores, apice crassiusculi; primi paris caeteris crassiores et longiores. Ad 1600  $\mu$ . long.; 1150  $\mu$ . lat.

*Habitat* super Coleopterum (gen.? sp.?) in « Australia (Lolworth) ». Coll. Cl. Froggatt.

Mas? Sento anale lato, trigono; sternale usque ad quartas coxas tantum producto; pedibus secundi paris caeteris validioribus, femure calcare robusto, pollicipato, genu calcari brevi et lato, tridenticulato; tibia calcare conico. Mandibularum calcare substyliformi, recto, sat brevi, transverso. Ad 1500  $\mu$ . long.; 1050  $\mu$ . lat.

*Habitat* super Coleopt. Lamellicornem in « Australia (Coonabarabran) ». Coll. Cl. Froggatt.

Gen. **Pachyseius** n. gen. Characteres generis *Pachylaelaps* sed scuta foeminae ventralia ut in gen. *Holostaspis*. Pedes antici ambulacro aucti; secundi paris tarso apice bicorni. Species typica *P. humeralis* n. sp.

**Pachyseius humeralis** n. sp. Foem. ochracea, ovalis, *Pachylaelaps*-tibus facie persimilis. Scutum genitale rectangulum, anterieus vix rotundatum et fimbriatum, postice truncatum, ventrali contiguum. Scutum ventrale cordato-ovatum, anterieus trun-

catum, postice rotundatum. Tarsi secundi paris apice robuste bicornes. Ad 660  $\mu$ . long.; 380  $\mu$ . lat.

*Habitat* in museis, raro. « Roma; Mugello ».

Subgen. **Olopachys** n. subgen. Ex gen. *Pachylaelaps*. Facies scutulorum ventralium in foemina gen. *Pachylaelaps* sed scuto ventrale cum anale omnino confuso. Pedes secundi paris tarso apice calcaribus ut in supradicto genere. Pedes antici ambulacratii. Color ut in *Pachylaelaptibus*. Differt a subgenere *Platylaelaps* (Berl.) propter senta perithrematica ut in *Pachylaelaps* (s. str.) usque ad scutum ventrale producta.

**Pachylaelaps (Olopachys) scutatus** n. sp. Foem. ochracea, ovalis, pilis simplicibus praecipue in corpore postico ornata. Pedum secundi paris femur inferne angulatum prominulo. Ad 720  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat. (Mas ignotus).

*Habitat* in muscis prope Romam, rarus. *Romania*

**Pachylaelaps cordiformis** n. sp. Foem. flavida, antierius subtruncata (excepto mucrone ad verticem), humeris bene angulosis, denique attenuata, cordiformis, postice acuta. Setulae corporis sat longae, praecipue ad marginem posticum. Scutum ventrale trapezinum, postice rotundatum. Pedes exiles. Ad 1050  $\mu$ . long.; 750  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris isidis*, « Egitto ». *Egypt*

**Pachylaelaps cordiformis** Berl. var. **australis** n. var. Foem. Differt a typico statura aliquanto maiore nec non pilis corporis multo curtioribus. Ad 1150  $\mu$ . long.; 800  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris hamadryas*, « Capo di Buona Speranza ».

**Pachylaelaps runculiger** n. sp. Mas citrinus, elongatus, postice acutus. Mandibularum calcar curvum (longitudine digiti), in summo fere digito articulatam, antierius directum, latum, subrunciforme, apice leniter subbilobum. Calcar femurale (2<sup>i</sup> paris) runcatum, apice oblique truncatum. Ad 430  $\mu$ . long.; 250  $\mu$ . lat.

*Habitat* rarus super *Copris molossus*, « Giava » (Jacobson!).

**Pachylaelaps runculiger** Berl., var. **falculiger** n. var. Differt a typico praecipue calcare pedum secundi paris permagno, polliciformi, interne serrulato, dimidiam longitudinem femuris superanti (in typico tantum spiniformis, brevis), nec non calcare mandibulari simpliciter runciformi, apice acuto, hand sub apice excavato. Mas ad 500  $\mu$ . long.; 280  $\mu$ . lat.

*Habitat.* Plurima exempla collegi inter pilos prosterni (post coxas) super *Copris hamadryas*, ad « Capo di Buona Speranza ».

**Pachylaelaps (Onchodellus) spectabilis** n. sp. Aurantiacus, facies Pachylaelaptis, sed curtior pedibusque longioribus. Senta omnia valde expolita. Corpus foeminae ovale. Scutum anale late trigonum, a ventrale remotum. Tarsus secundi paris apice calcari unico, valido armatus. Mas cordatus, postice acutus, valde humeratus; secundi paris femure longe pollicipato; genu tubere curto, bituberculato; tibia tuberculo breviter conico. Foem. ad 1150  $\mu$ . long.; 850  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris* sp., « Giava ». Collegit Cl. Jacobson.

Subgen. **Elaphrolaelaps** n. subgen. (Subgenus gen. *Pachylaelaps*, inter *Sphaerolaelaps* et *Onchodellus*). Senta ventralia et epistoma satis ut in gen. *Pachylaelaps*, sed pedes valde longiores, crassitie subpares; secundi paris apice calcare nullo. Foem. sento genitale (cum ventrale confuso) valde ab anale remoto. Corpus ovatum, hand humeratum. Species typica *E. fenestratus* n. sp.

**Pachylaelaps (Elaphrolaelaps) fenestratus** n. sp. Foem. Scuta, pedes et rostrum flavo-fuliginea. Scutum dorsuale ad humeros utrinque incisura albida profunda quasi fenestra lineari, transversa incisum. Pili corporis mediocres. Scutum genito-ventrale late trapezinum, anterius rotundatum, posterius cum sentis lateralibus lineam rotundatam conficiens. Scutum anale valde remotum, parvum, trigonum, longius quam latum. Facies nymphae coleoptratae *Gamasi coleoptratorum*. Ad 1500  $\mu$ . long.; 1000  $\mu$ . lat.

*Habitat* supra *Copris* sp., « Giava »; Coll. Jacobson.

**Megalolaelaps enceladus** n. sp. Foem. badia, postice acuta, hirsutissima, pilis densis, longis, praecipue ad corpus posticum induta; trochanteribus tertiis et quartis in margine (femurali) valide corniculatis; metapodis minimis, sublinearibus; tarsis omnibus, exceptis primi paris, appendicibus duabus longe lanceolatis, brunneis ornatis. Ad 2400  $\mu$ . long.; 1600  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris carolina*, « America, boreale ».

**Megalolaelaps spinirostris** n. sp. Foem. scutis, rostro pedibusque castaneo-fuligineis. Corpus rectangulo-ovale, postice rotundatum, sat latum, humeratum, totum pilis densis medioeribus vestitum. Pedes crassitie interese pares. Sternum valde latum et curtum. Scutum genitale valde latum, peculiaris fabricae. Adsunt spinae robustiores quatuor, quasi corniculi in medio rostro infero. Ad 1250  $\mu$ . long.; 900  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris* sp., « Giava ». Coll. Jacobson.

**Megalolaelaps radiatus** n. sp. Foem. scutis, rostro pedibusque castaneo-fuligineis. Corpus elongato-ovale, postice strictius quam ad humera, totum pilis sat densis longioribus (dimidiam latitudinem corporis aequantibus vel superantibus) etiam in sento dorsuale praesentibus, ad margines radiatim dispositis ornatum. Pedes crassiusculi. Sternum longius quam latum, strictum. Scutum genitale perparvulum, valde strictum. Ad 1100  $\mu$ . long.; 600  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris* sp., « Giava ». Coll. Jacobson.

**Megalolaelaps orientalis** n. sp. Foem. scutis, rostro, pedibusque castaneo-fuligineis. Corpus ovatum, postice vix latius quam ad humeros. Margo corporis et venter subglabri, humeri tamen setis aliquot longis et robustis. Sternum trapezinum, usque ad medias secundas coxas productum. Scutum genitale minimum, strictum. Scutum anale perlongum (long. 500, lat. 350), fere duplo longius quam latum, spatio minimo a genitale remotum. Ad 1500  $\mu$ . long.; 1100  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris* sp., « Giava » Coll. Jacobson.



Subgen. **Hoplolaelaps** n. subgen. Ex gen. *Laelaps*. Foem. characteres subgeneris *Eulaelaps*, sed scutum metapodiceum eum peritrematico omnino confusum, magnum. Species typica: *L. H. doderoi* n. sp.

**Laelaps (Hoplolaelaps) doderoi** n. sp. Badius, pyriformis, convexus, nitidus, postice setis longiusculis duabus. Tarsi antici setis aliquot longissimis praediti, nec non ambulacro longe pedunculato. Epistoma trispinum. Ad 470  $\mu$ . long.; 320  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo prope « Genova ». Coll. Clariss. Dodero entomologus praeclarus et benemeritissimus, cui speciem volui dicatam.

**Laelaps (Hoplolaelaps) paulseni** n. sp. Foem. Badius, *L. doderoi* affinis sed elongatior, dorso setis robustis aucto, postice aliquanto maioribus et robustioribus (quatuor); pedum anticorum ambulacro subsessili. Ad 590  $\mu$ . long.; 330  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Plura collegi exempla in muscis agri Panormitani. Speciem Cl. Paulsen rei agrariae et praecipuae ampelographicae eximio cultori dicatam volui.

**Laelaps (Hypoaspis) gryllotalpae** n. sp. Terreus, elongate-ovalis, setis curtulis, vestitus, pedibus longissimis, gracilibus (primi quartique paris corporis longitudinem valde superantibus). Epistoma denticulis altis totum ornatum. Foem. sentum ventrale (eum genitale confusum) parum post quartas coxas productum, rotundatum. Mas calcare mandibulari recto, tamen introrsus aliquanto incurvo, anterieus porrecto, longo, margine externo biangulato, apice rotundato. Ad 850  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat. (Foem.).

*Habitat* communis super *Gryllotalpa vulgaris*, « Giava ». Coll. Cl. Jacobson.

**Laelaps (Hypoaspis) dasygaster** n. sp. (Foem.). Flavus, ovatus, postice acutus. Scutum dorsuale subglabrum, tantum pilis minutissimis, raris ornatum. Abdominis pars mollis, praecipue ad ventrem circa sentum anale pilis sat longis, densis induta.



Scutum ventrale (cum genitale) ovatum, valde ultra quartas coxas productum, postice rotundatum, lateralibus parallelis. Pedes longi, crassi, spinosi, ambulacris maioribus. Ad 900  $\mu$ . long.; 530  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Diastocera trifasciata*, « Africa ».

**Laelaps** (subgen. ?) **remiger** n. sp. Mas pallide terreus, sterno appendicibus quatuor late remiformibus, sat magnis ornato; digito mobili mandibulae calcare falciforme, digito eiusdem duplo longiore. Ad 650  $\mu$ . long.; 340  $\mu$ . lat.

*Habitat* in ligno putri, « Giava ». Coll. Cl. Jacobson.

**Laelaps** (subgen. ?) **parvulus** n. sp. Mas terreus, rectangulus, bene humeratus; sento sternali ad quartas coxas tantum producto. Minimus. Ad 330  $\mu$ . long.; 180  $\mu$ . lat.

*Habitat* in ligno putri, « Batavia, Giava ». Coll. Cl. Jacobson.

**Laelaps** (subgen. ?) **ampullula**. Foem. terrea, mollis, bursiformis, vix postice curtissime bipila. Scutum anale parvulum, late semicirculare-trigonum, valde a genitale discretum. Hypostoma corniculis nullis. Ad 750  $\mu$ . long.; 550  $\mu$ . lat.

*Habitat* in nidis et super *Apis indica*, « Batavia (Giava) ». Coll. Cl. Jacobson.

**Laelaps** (subgen. ?) **scutatus** n. sp., Foem. terrea, sentis ventralibus omnibus ut in gen. *Holostaspis* dispositis, bene sculptis. Pedes crassinseculi; corpus ovatum, spinulis vel setis brevissimis ad margines et postice auctum. Ad 450  $\mu$ . long.; 340  $\mu$ . lat.

*Habitat* in ligno putri, « Batavia (Giava) ». Coll. Jacobson.

**Berlesia cultrigera** n. sp. Terrea, ovata, setis sat longis hirtella, pedibus crassis. Foem. mandibulis parvulis, digito mobili parvo, denticulato. Scutum genito-ventrale longe rectangulum. Hypostoma tuberculis nullis. Ad 500  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat. Mas pedibus curtioribus et robustioribus, mandibulae calcare brevi, digito duplo longiore, vix incurvo, apice pedis humani more conformato. Ad 370  $\mu$ . long.; 230  $\mu$ . lat.

*Habitat* eum pullis et ovis, parasita verus, ad alas posteriores cuiusdam locustae ex fam. *Conocephalidae*. Coll. Cl. Jacobson in « Batavia (Giava) ».

Differt a *B. rapace* Australiae statura minore, tuberculis hypostomatis nullis, scuto genito-ventrale valde elongatiori aliisque characteribus.

Subgen. **Haemolaelaps** n. subgen. Characteres subgen. *Laelaps* (s. str.) sed scuto ventrale ab anale remoto; mandibularum digito fixo seta perlonga, filiformi aucto. Spec. typica *L. H. marsupialis* n. sp.

**Laelaps (Haemolaelaps) marsupialis** n. sp. (Foem.). Pallidus, longe ovalis, totus dense setis sat longis vestitus, scuto ventrale (eum genitale confuso) rotundato, ab anale discreto, sat conspicuo. Mandibularum digitus fixus mollis, mobili eurtior et sub apicem longa setula filiformi terminatus. Ad 800  $\mu$ . long.; 470  $\mu$ . lat.

*Habitat* super « Bandicoot » (Marsupialis ex fam; *Peramelidae*, gen. ? spec. ?) « Australia ». Coll. Cl. Froggatt.

**Leioognathus spinosus** n. sp. Mas terreus, facies *L. albat*i, sed setis corporis multo robustioribus, spiniformibus. Ad 520  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Pteropus edulis*, « Batavia (Giava) ». Coll. Cl. Jacobson.

Gen. **Copriph**is n. gen. Species typica: *C. pterophilus* Berl. (*Iphis pterophilus* Berl.).

**Copriph**is modestus n. sp. Rubro-badius, subrotundus, setulis spiniformibus marginalibus eurtulis; epistoma ut in *C. pterophilo*. Ad 400  $\mu$ . long.; 280  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris*, « Giava » Coll. Cl. Jacobson.

**Copriph**is cultratellus n. sp. Rubro-badius, facies omnino *C. drepanogasteri*, sed foem. sterno appendicibus cultriformibus octo, nec non una conformi in quaque coxa, excepta postrema. Ad

640  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat. Mas subsimilis, sed appendicula ad secundas coxas nulla.

*Habitat.* Plura collegi exempla super *Copris* varios, « Giava » (Jacobson !), nec non super *Copris isidis*, « Egitto ».

**Copriphhis hastatellus** n. sp. Rubro-badius, ovatus; facie *C. modesti*, sed aliquanto maior, setis spiniformibus circumdatus. Foem. appendiculis cultriformibus in sterno duabus, quaque ad coxas tertii paris nec non in coxis iisdem secundi et quarti paris. Ad 450  $\mu$ . long.; 380  $\mu$ . lat.

*Habitat* ad pilos pectoris super *Copris hamadryas*, « Capo di Buona Speranza ». Plura possideo exempla.

**Copriphhis aster** n. sp. Foem. rufo-badia, sat elongate ovalis, setis marginalibus longiusculis, mollibus; sternalibus omnibus simplicibus. Ad 750  $\mu$ . long.: 550  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris hypocrita*, « Pernambuco ».

**Copriphhis puer** n. sp. Foem. Pallide terrea; facies *C. repandi*, cuius speciei valde affinis. Differt tamen a *C. repando* praecipue scutulorum ventralium fabrica, quod in *C. puero* scutula ad latera vulvae minima sint, punctiformia (in *C. repando* longa linearia); scuta peritrematica non pedes quarti paris attingunt (in *C. repando* ultra quartos pedes sunt, retrorsus producta); scutulaeque metapodica evanida. Ad 450  $\mu$ . long.; 320  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Copris hispanus*, « Spagna ».

**Copriphhis repandus** n. sp. Sat pallide rubro-badius, elongatulus, lateribus subparallelis, postice rotundatus; setis spiniformibus curtioribus indutus. Mas calcare mandibulari brevior, exiliori, in spirulam convolutum. Foem. ad 450  $\mu$ . long.; 270  $\mu$ . lat.

*Habitat* innumerus cum pullis etc. ad ventrem *Copridis molossi* et aliorum, « Giava ». (Jacobson !).

**Copriphhis degenerans** n. sp. Foem. terrea, ovalis, postice acutula, glabra, scuto peritrematico striato, vix quartas coxas

attingente. Pili ventris omnes simplices. Ad 750  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat.

*Habitat* ad humeros *Catarsii sabaei*, « India Orientale ».

**Greenia jacobsoni** n. sp. Foem. flavo-badia. Scutum dorsuale integrum, valde elongatum, parce pilosum. Abdomen pilis aliquot sat longis in margine tantum extremo. Coxae omnes spinis mediocriter robustis ornatae. Sternum late clepsidraeforme, margine postico integro. Ad 1750  $\mu$ . long.; 900  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Xylocopa aestuans*, « Giava ». Coll. Cl. Jacobson. Differt a *G. alfkeni* Oud. (quae adulta mihi videtur), statura, senti dorsualis fabrica aliisque characteribus.

**Greenia hirtissima** n. sp. Foem. flavo-badia, *G. jacobsoni* primo visu similis, sed pilis longis densioribus in dorso et ad margines ornata. Coxae primi, secundi tertiique paris appendicibus percrasse spiniformibus, ovatis, armatae. Ad 1850  $\mu$ . long.; 950  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Xylocopa (aestuans?)*, « Giava ».

**Pteroptus heteropus** n. sp. Pedibus anticis valde caeteris crassioribus (fere duplo). Mas (cum pedibus) ad 1500  $\mu$ . long.; Foem. ad 2000  $\mu$ . long.

*Habitat* super *Pteropus edulis*, « Batavia (Giava) ». Colleg. Cl. Jacobson.

## CRYPTOSTIGMATA

(*Oribatidae*).

**Achipteria nicoleti** Berl. var. **ewingi** n. var. Differt a typico Europae praecipue alis tecti apice denticulo externo extrorsus recurvo et producto; pteromorphis processu antico longiori. Ad 530  $\mu$ . long.; 350  $\mu$ . lat.

*Habitat* in muscis, « Florida » (« Lake City »).

**Oribatella misella** n. sp. Castanea, nuda. Alis tecti perparvulis, intersese contiguis, dentibus anticis curtis. Organa pseudo-

stigmatica sat longe et bene clavata. Uncus pedum unicus. Degenerat. Ad 280  $\mu$ . long.; 200  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo, « Giava ». (Jacobson!).

**Sphaerozetes (Tectoribates) proximus** n. sp. Saturate castaneus. Facies *S. howardi* et *S. tecti*, sed statura aliisque characteribus diversus. Ad 350  $\mu$ . long.; 240  $\mu$ . lat.

*Habitat* in museis ad « Genova, Casalmongera, Macerata (Roma) ».

**Sphaerozetes strandi** n. sp. Badius, pyriformis, setis crassiusculis, longiusculis hirtus. Tecti lamellae tantum usque in medio antico productae, lata translamella intersese coniunctae, apice acutae, caeterum ut in *S. setoso* conformatae. Organa pseudostigmatica clavata. Genu et tibia primi et secundi paris seta robusta, spiniformi aucta. Ad 700  $\mu$ . long.; 400  $\mu$ . lat.

*Habitat* rarus in « Groenlandia ». Coll. Cl. Strand.

**Sphaerozetes pedemontanus** n. sp. Castaneus. Facies speciei *Euzetes depauperatus*, sed multo maior, subsphaericus; alis tecti apice parum prominulis, acutis, lata translamella coniunctis; organis pseudostigmaticis curte claviformibus. Glaber. Ad 580  $\mu$ . long.; 460  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo ad « Torino ».

**Euzetes egenus** n. sp. Testaceo-badius. Facies *E. depauperati* quamvis aliquanto longior, non tamen ut *E. pusillus* Europae, pteromorphisque maioribus, sive posterius magis productis. Organa pseudostigmatica sat longe clavata (fere ut in *E. pusillo*). Ad 260  $\mu$ . long.; 200  $\mu$ . lat.

*Habitat* in museis, « Florida » (« Lake City »).

**Ceratozetes magnificus** n. sp. Castaneo-fuscus, antice rubescens; tecti alis in cornua perlonga (dimidiam alam eandem longitudine aequantia) productis; setis pseudostigmaticis sensim incrassatis, conicis, longiusculis, nudis; unco pedum unico. Ad 500  $\mu$ . long.; 380  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria, « Palermo ».

**Punctoribates insignis** n. sp. Castaneo-niger, grandis; alis tecti acutioribus; setis pseudostigmaticis longe clavatis; pedum secundi paris tarso ad dorsum valido calcari ornato. Ad 430  $\mu$ . long.; 360  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria, « Palermo ».

**Peloribates histricinus** n. sp. Castaneus, affinis *P. banksi*, sed minor, organis pseudostigmaticis curtioribus et melius clavatis. Derma undique areolis minimis, rotundis asperatum. Pili dorsi omnes longi, nigrescentes, asperuli. Ad 400–440  $\mu$ . long.; 310–330  $\mu$ . lat.

*Habitat* in « Florida ».

**Protoribates (Scheloribates) crinitus** n. sp. Badius, elongatissimus, postice setis longissimis octo, exilioribus ornatus. Organa pseudostigmatica eurve clavata, subpyriformia. Ad 400–600  $\mu$ . long.; 160–270  $\mu$ . lat.

*Habitat* in « Florida ».

**Oribella cornuta** n. sp. Laete badia, nitidissima, glabra (tamen postice longe bipila); abdomine cordiformi, postice acuto; setis pseudostigmaticis longe fusiformibus; alis tecti antierius in cornicula bene longa, piligera desinentes. Ad 570  $\mu$ . long.; 330  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria, « Palermo ».

**Tectocephus personatus** n. sp. Castaneus, totus velo hyalino, granulis rotundis nigris occupato indutus. Abdomen subdiscoidalis, in medio dorso excavato-depressus, pilis minutissimis, raris ad marginem posticum. Anticum magnum, conicum, lamellis perlongis et altis, longe rectangulis, striatis, subhyalinis, apice curtissimo pilo terminatis. Organa pseudostigmatica eurve clavata, villosa. Ad 420  $\mu$ . long.; 230  $\mu$ . lat.

*Habitat* in muscis agri Tridentini.

**Scutovertex perforatus** n. sp. Castaneo-piceus totus, macula rotunda in summo abdomine ad dorsum, rotunda, pallide flava



quasi foramen. Derma dorsi aequè punctulatum. Anticum cum abdomine fere confusum (facies *Ameronothri*). Organa pseudostigmatica setuliformia. Ad 390  $\mu$ . long.; 210  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo prope Neapolim (« Portici »).

**Hydrozetes terrestris** n. sp. Castaneus, ovalis, sat elongatus, postice subtruncatulus, pilis ibi brevibus duobus auctus. Anticum lineis concurrentibus bene conspicuis, carinuliformibus; organa pseudostigmatica sat longa, clavata; pedes magni et crassiusculi. Ad 550  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat.

*Habitat* communis inter folia putria, « Palermo ».

**Neoliodes capensis** n. sp. Nigerrimus, globularis, pedibus crassis et longis. Abdomen hemisphaericus, plus minusve gibbere mediano elevatus, in medio areolis sat discretis, rotundis, parvulis, ad latera striis radiatim transversis, antice foveolis minimis appressis exharatus. Organa pseudostigmatica curte fusiformia. Usque ad 1800  $\mu$ . long.; 1250  $\mu$ . lat.

*Habitat* super plantas ad « Capo di Buona Speranza ».

**Nothrus superbus** n. sp. Castaneo-fulgineus. Facies *N. spinigeri*, sed maior, elongatior, pilis abdominis, quamvis longissimis, tamen non bene circumnatis. Abdomen in dorso vix excavatus, glaber, tantum antice pilis duobus anterieus directis, non tuberculo sustentis. Ad 1400  $\mu$ . long.; 600  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo, « Palermo ».

**Sphaerochthonius elegans** n. sp. Testaceo-fuliginosus, rotundato-rectangulus, aliquanto elongatior quam *S. splendidus*, a quo valde diversus. Abdomen in dorso transverse triseptatus, appendicibus peculiaribus late T-formibus, brevissime pedunculatis, granosis, ad incisuras 2<sup>am</sup> et 3<sup>am</sup> nec non in extremo postico articulo ornatus. Segmentum 1<sup>um</sup> abdominis (in dorso) pilis 4 longiusculis granosis. Organa pseudostigmatica fere ut in *S. splendido*. Ad 260  $\mu$ . long.; 190  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo, « Giava » Coll. Cl. Jacobson.



Gen. **Arthrhophophora** n. gen. Genus gen. *Protophophora* adpropinquandum quod *Hoplophora* sit abdomine ut in *Hypochthonis* articulo. Abdominis segmentum primum ad dorsum in clypeum maximum elongatum, totum caeterum abdomen protegens, dilatatum. Ungues pedum bini (magnitudine paradoxo). Species typica *A. paradoxa* n. sp.

**Arthrhophophora paradoxa** n. sp. Badia, in sphaerulam contractilis. Anticum sat magnum, rectangulum, antice angulatum. Abdominis articulus secundus et tertius ad dorsum margine postico pilis densissimis, plumosulis, perlongis, fimbriam pulcherrimam conficientibus ornatus. Pili isti extremum abdomen superant, in ventrem deflectuntur et sento abdominale primo (dorsi) sunt obtecti. Pedes mediocres; unguis longissimus, falcatus, fere totius pedis longitudinem aequantes. Organa pseudostigmatica longe setuliformia, vix barbatula. Ad 450  $\mu$ . long.; (aperta) 300  $\mu$ . lat.

*Habitat* in humo « Giava ». Coll. Cl. Jacobson.

(*Sarcoptidae*).

**Carpoglyphus vagabundus** n. sp. Minus elongatus quam *C. pas-salarum*, rectangulus, postice tantum bisetus (setis longis), dermate punctulato, duriusculo. Mas pedibus aliquanto robustioribus quam in foem.; pene inter quartos pedes bene chitineo. Vulva inter quartas et tertias coxas aperta. Foem. ad 500  $\mu$ . long.; 270  $\mu$ . lat.; mas ad 400  $\mu$ . long.; 240  $\mu$ . lat.

*Hypopus* rhombicus, postice acutus, breviter bisetus ibique membranula subhyalina late triloba alte ornatus; disculis adhaesionis octo magnis duobusque minimis; pedum ambulo ut in adulto, ad extremi paris tantum ungue inter setas longiores duas. Pars antica corporis ut in hypopis *Trichotarsi xylocopae*. Ad 360  $\mu$ . long.; 220  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Inveni paucos adultos multosque hypopos in nido *Polistis gallicae* ad « Rosignano (Pisa) », certe ibi casu praesentes.

**Tyroglyphus pergrandis** n. sp. (Foem.). Albidus, pedibus roseis, statura maxima, setis sat longis ornato. Ad 1500  $\mu$ . long.; 1000  $\mu$ . lat.

*Habitat* « Giava ». Coll. Cl. Jacobson.

**Tyroglyphus (?) incertus**. Nympha albido-hyalina; ungue pedum e membranula ambulacrali prominulo sat magno, ad basim unguis in quoque pede utrinque seta transverse erecta et denique antrorsus plicata adest. Setae duae humerales, duae scapulares, duaeque posticae fere corpus longitudine aequantes, exiles adsunt; duae ad verticem minores. Ad 500  $\mu$ . long.; 280  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Plurima exempla collegi sub alis *Copridis* cuiusdam, « Giava » (Jacobson!).

Gen. **Coleoglyphus** n. gen. Characteres simul generis *Coleopterophagus* et *Tyroglyphus*. Species typica *C. fuscipes* n. sp.

**Coleoglyphus fuscipes** n. sp. (Foem.). Albicans, pedibus, rostro, epimeris, scuto trapezino ad verticem nec non circinibus ad basim pilorum disculisque genitalibus fuscis, fuliginis. Epimera antica inter sese discreta. Margo corporis posticus rotundatus, mucrone conico permagno (300  $\mu$ . long.). Setae in postico abdomine octo, duae scapulares, duaeque humerales maximae (posticae quatuor corporis longit. aequantes). Ad 1500  $\mu$ . long. (sine rostro et mucrone); 900  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Collegi super *Tefflus megerlei*, « Africa ».

*Nympha* disculis genitalibus tantum duobus. Tarsi postici dimidiam pedum longitudinem aequantes. Dorsum setis octo anticis, sexque posticis longissimis, ex istis quatuor corpore longiores, perrobustis. Ad 850  $\mu$ . long.; 500  $\mu$ . lat.

*Habitat*. Unam nympham inveni super *Copris hamadryas*, inter pilos pectoris ad « Capo di Buona Speranza », larvasque nonnullas sub alis. An species diversa, nomine *C. longitarsus* distinguenda?

*Hypopus*. Bene badius, nitidus, perconvexus, subdiscoidalis, tamen postice latior, rotundatus, antice angulatus. Disculi

adhaesionis 12, nec non tuberculi disculiformes tres disculis veris commixti. Pedes omnes breves, ungue nec non pilis adhaesionis duobus, uno longo, altero brevi, infundibuliformibus apice aucti. Ad 420  $\mu$ . long.; 340  $\mu$ . lat.

*Habitat* ad pectus *Teffli megerlei* cum foemina supradicta collectus.

**Canestrinia manicata** n. sp. Mas perfecte rhombicus, postice subacutus, ibique setulis basi crassis, longis quatuor, appendiculis foliiformibus duabus ornatus. Pedes tertii paris monstruosi, tibia abnormiter in cornum ad dorsum producta, tarso late trigono, femure calcarigero. Ad 400  $\mu$ . long.; 400  $\mu$ . lat. Foem. simplex, postice rotundata, quadripila, humerata. Ad 600  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat.

*Habitat* super *Doriphora tessellata*, « Brasile ».

**Canestrinia spectanda** n. sp. Mas rhombicus, postice attenuatus, recte truncatus, pilis longissimis quatuor, percurtulis duobus, Pedes crassitie pares. Tarsi tertii quartique paris longissimi, falcati. Disculi copulationis magni, circine fusco extrorsus protecti, intersese contigui. Ad 600  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat. (Caeterum valde statura variat). Foem. maris subsimilis, vix maior.

*Habitat* super *Dorcus bucephalus*, « Giava ».

**Canestrinia microdisca** n. sp. *C. spectandae* subsimilis, sed bene diversa. Mas tarsis curtioribus quam in *C. spectanda*, disculisque copulationis perparvis, rotundis, incoloribus. Penis rectus, sat longus, apice acutus. Ad 550  $\mu$ . long.; 450  $\mu$ . lat. Foem. subsimilis, vix maior.

*Habitat* super *Dorcus saiga*, « Giava ».

**Canestrinia nepalensis** n. sp. Foem. sat elongata, subovalis, humeratulata, postice late arenato-truncata, longe quadripila. Tarsi omnes mediocriter elongati. Ad 480  $\mu$ . long.; 300  $\mu$ . lat. Mas ignotus.

*Habitat* super *Dorcus nepalensis*, « Giava ».

Gen. **Canestriniella** n. gen. Caracteres gen. *Canestrinia* maris tamen pedibus tertii et quarti paris (istis caeteris crassioribus) ambulacro destitutis, tantum ungue valido terminatis. Typus *C. amplexans* n. sp.

**Canestriniella amplexans** n. sp. Mas rhombico-circularis, abdomine post quartos pedes strictiori, spathulato, utrinque sat longe bipilo (ad angulum postico-lateralem). Pedes quarti paris (quibus foeminam amplexatur in copula) caeteris validiores, forcipis more introrsus recurvi. Mas ad 380  $\mu$ . long.; 290  $\mu$ . lat.

*Habitat.* Plurima paria super *Batocera hector* ad « Batavia (Giava) » collegit Cl. Jacobson.

**Canestriniella togata** n. sp. Albida. Mas dimidio abdomine postico in lobulos hyalinos permagnos duos, intersece profundiore incisura discretos, quisque longe et acutissime bifidus et bisetus (setarum harum una in incisura cuiusque lobuli, altera in latere externo). Disculi copulationis intersece valde approximati, inter quartas coxas insiti. Pedes quarti paris percrassi. Ad 600  $\mu$ . long.; 320  $\mu$ . lat.

*Habitat.* Plurimos collegi mares in copula foeminasque ovigeras super *Batocera lunulata* et *B. spec.* « Giava, Indie orient. ».

**Histiostoma brevipodum** n. sp. Albidus, pyriformis, rostro apicali magno, palporum setis pedes primos longitudine aequantibus, pedibus omnibus crassis et percurtis. Foem. ad 350  $\mu$ . long.; 200  $\mu$ . lat.

*Habitat* inter folia putria, « Palermo ».

## HETEROSTIGMATA.

**Podapolipus batocerae** n. sp. Foemina ovigera subrectangula, postice truncata, ad humeros latissima, rotundata, anterieus strictior, conica, in summo antico corpore pedibus anticis sat

longe conicis, secundi paris brevius coniformibus, praedictis adpressis. Mares consuetae figurae nec non iuvenes, sed sentis epimeralibus latis, perconspicuis, dermate striato intersese optime distinctis. Foem. ovigera ad 850  $\mu$ . long. ; 600  $\mu$ . lat. ad scapulas. Mares invenesque ad 350  $\mu$ . long. (cum rostro); 150  $\mu$ . lat.

*Habitat* innumerus sub alis *Batocerae hectoris*, « Batavia, Giava ». Collegit Cl. Jacobson.

Gennaio 1910.